



BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 6 **Periodo di Rilevazione: 03/07/2017 - 09/07/2017**

ORGANIZZAZIONE: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.


STADIO FENOLOGICO : Indurimento nocciolo

COMPRENSORIO:

P.ra di Lecce Nord

ARNESANO
CAMPI SALENTINA
COPERTINO
LECCE
NARDO'
NOVOLI
SALICE SALENTINO
SURBO
TORCHIAROLO

TREPUZZI
VEGLIE

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra di Lecce Nord	16,35	2,71	10	=	

CONSIGLI PER LA DIFESA

Sulla base dei risultati dell'attività di campionamento di questa settimana, il grado di infestazione di tignola dell'olivo (*Prays Oleae*) risulta complessivamente sotto la soglia d'intervento con catture di adulti relativamente basse e una percentuale media di infestazione sotto la soglia d'intervento. Pertanto, anche questa settimana non si consiglia alcun intervento, tenendo anche presente che si è nella fase fenologica di inizio indurimento nocciolo, cioè ai limiti per un eventuale trattamento chimico che risulti efficace contro tale parassita.

